

# PARTE III

## MALATTIE CARDIOVASCOLARI ACQUISITE

### CARDIOPATIA ISCHEMICA: COMPLICANZE CHIRURGICHE DELL'INFARTO MIOCARDICO

Luigi Chiariello, Paolo Nardi, Guglielmo Saitto, Giovanni A. Chiariello



---

## SOFFIO OLOSISTOLICO

In un paziente con infarto miocardico acuto la comparsa di un soffio olosistolico è indice di possibile

- a.  Insufficienza mitralica acuta
- b.  rottura di cuore
- c.  occlusione acuta della discendente anteriore
- d.  aritmia ventricolare

---

## RESEZIONE LINEARE SEC. COOLEY

La resezione lineare sec. Cooley è l'intervento chirurgico indicato per quale delle seguenti patologie?

- a.  insufficienza mitralica acuta postinfartuale
- b.  difetto interventricolare postinfartuale
- c.  tachicardia ventricolare
- d.  aneurisma ventricolare sinistro

---

# SHOCK CARDIOGENO

Lo shock cardiogeno in un paziente con infarto miocardico STEMI può essere dovuto a

- a.  difetto interventricolare postinfartuale
- b.  difetto interatriale
- c.  stenosi aortica severa
- d.  dolore toracico refrattario a terapia con nitrati

---

## **DIFETTO INTERVENTRICOLARE POSTINFARTUALE**

Un difetto interventricolare postinfartuale può essere trattato con

- a.  PTCA d'emergenza
- b.  solo terapia medica
- c.  contropulsazione aortica, stabilizzazione clinica quando possibile e trattamento chirurgico
- d.  ogni terapia è controindicata vista l'elevatissima mortalità

---

## **ANEURISMA VENTRICOLARE SINISTRO**

Dopo quanto tempo dall'infarto miocardico acuto si forma un aneurisma ventricolare sinistro?

- a.  oltre 21-28 giorni
- b.  4-7 giorni
- c.  24-36 ore
- d.  nelle prime 6 ore

---

## INTERVENTO SEC. DOR

L'intervento sec. Dor prevede:

- a.  la resezione circolare di un aneurisma ventricolare sinistro e la ricostruzione con un patch di dacron
- b.  la resezione lineare di un aneurisma ventricolare sinistro senza l'interposizione di un patch
- c.  la plicatura del ventricolo sinistro
- d.  la riparazione di una corda rotta

---

## SEGNO ECOCARDIOGRAFICO

Il segno ecoardiografico che distingue un aneurisma ventricolare sinistro è:

- a.  la dissincronia del setto
- b.  la discinesia
- c.  l'ipocinesia
- d.  l'ipercinesia



---

## CASO CLINICO

Un paziente arriva in pronto soccorso ipoteso, marezzato, con giugulari turgide. L'ecocardiogramma mostra versamento pericardico tamponante. Si esegue una pericardiocentesi che mostra sangue rosso vivo. Ipotesi diagnostiche:

- a.  rottura di cuore postinfartuale
- b.  pericardite virale
- c.  pericardite tubercolare
- d.  sindrome postpericardiotomica

---

## **CONTROPULSAZIONE AORTICA**

La contropulsazione aortica è un presidio spesso necessario per la gestione di:

- a.  difetto interventricolare postinfartuale
- b.  dissezione aortica
- c.  insufficienza aortica
- d.  rottura parete ventricolare sinistra

---

## **INSUFFICIENZA MITRALICA ACUTA POSTISCHEMICA**

L'insufficienza mitralica acuta postischemica riconosce come substrato anatomopatologico:

- a.  la rottura cordale associata ad un prolasso mitralico
- b.  la perforazione del lembo anteriore della valvola mitralica
- c.  la rottura o disfunzione di un muscolo papillare
- d.  una dilatazione anulare acuta

---

## ECG 12D

Un ECG 12D mostra ritardo della conduzione intraventricolare sinistra con ST-T

- a.  Sindrome di Brugada
- b.  Valvulopatia mitralica
- c.  Aneurisma ventricolare sinistro
- d.  Difetto interventricolare

---

## INSUFFICIENZA MITRALICA

Il trattamento chirurgico di un'insufficienza mitralica acuta consiste in:

- a.  sostituzione valvolare con bioprotesi
- b.  sostituzione valvolare con protesi meccanica
- c.  Quando possibile riparazione valvolare mitralica con impianto di anello e neocorde
- d.  Tutte le risposte precedenti

---

## CABG

In quali casi è indicato il CABG di emergenza durante infarto miocardico acuto in assenza di complicanze meccaniche?

- a.  malattia ostruttiva del tronco comune o trivasale non trattabile con PCI
- b.  ostruzione completa della coronaria destra
- c.  sempre nello shock cardiogeno
- d.  mai

---

## COMPLICANZE POSTINFARTUALI

Quale delle seguenti complicanze postinfartuali è definita come "meccanica"?

- a.  Shock cardiogeno
- b.  Tachicardia ventricolare
- c.  Sindrome di Dressler
- d.  Insufficienza mitralica acuta

---

# INFARTO MIOCARDIO ACUTO

Quale delle seguenti terapie è attualmente considerata di prima scelta nel trattamento dell'infarto miocardio acuto?

- a.  PCI
- b.  somministrazione di eparina endovena
- c.  CABG
- d.  trombolisi sistemica



RISPOSTE  
CORRETTE

DOMANDA	RISPOSTA
1	A
2	D
3	A
4	C
5	A
6	A
7	B
8	A
9	A
10	C
11	C
12	D
13	A
14	D
15	A