

PARTE III

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

ACQUISITE

VALVULOPATIA TRICUSPIDALICA

Mauro Rinaldi, Davide Ricci, Massimo Boffini, Suad ElQarra



VALVOLA TRICUSPIDE

La valvola tricuspide è situata:

- a. Nel cuore destro
- b. Nel cuore sinistro
- c. Sopra al fegato a livello dello sbocco in atrio destro della vena cava inferiore
- d. All'interno della vena cava superiore

INSUFFICIENZA DELLA TRICUSPIDE

L'insufficienza della tricuspide (IT) può essere:

- a. Organica
- b. Funzionale
- c. E' sempre presente nella sindrome di Marfan
- d. risposte A + B

IT SEVERA NON TRATTATA

Che sopravvivenza comporta un IT severa non trattata?

- a. > 90% a 10 anni
- b. < 50% a 5 anni
- c. < 10% a 3 anni
- d. < 20% a 2 anni

STENOSI TRICUSPIDALE

Quale è l'eziologia più frequente di una stenosi tricuspidale?

- a. Ischemica
- b. Degenerativa
- c. Reumatica
- d. Nessuna delle precedenti risposte

SOSTITUZIONE DELLA TRICUSPIDE

La sostituzione della tricuspide:

- a. E' la tecnica più spesso eseguita
- b. Viene eseguita raramente, solo quando non sono indicate le tecniche di riparazione
- c. Con l'impiego di una protesi meccanica rispetto a una bioprotesi si associa a migliori risultati a distanza
- d. Non viene mai eseguita

BICUSPIDALIZZAZIONE

Quale Autore ha proposto la tecnica di anuloplastica con "bicuspidalizzazione" della tricuspide?

- a. Kay
- b. De Vega
- c. Alfieri
- d. necessita in genere di trattamento conservativo e soltanto raramente di intervento chirurgico

APPROCCIO MINIINVASIVO MINITORACOTOMICO

In quali casi l'approccio miniinvasivo minitoracotomico può essere una valida alternativa chirurgica alla tradizionale sternotomia mediana nel trattamento dell'IT?

- a. Nei pazienti con rischio operatorio molto elevato
- b. Nei reinterventi
- c. In tutti i casi in cui si può effettuare la riparazione della valvola
- d. Risposte A + B

TRATTAMENTO DELL'IT

Quale tipo di intervento per il trattamento dell'IT viene più frequentemente effettuato?

- a. Plastica valvolare con o senza impiego di anello protesico
- b. Plastica valvolare sempre associata alla sostituzione della valvola polmonare
- c. Sostituzione valvolare
- d. Trapianto cardiaco

IT DI "TIPO II"

In quale caso l'IT si definisce di "Tipo II"?

- a. Prolasso di uno o più lembi valvolari
- b. Restrizione del movimento dei lembi valvolari
- c. I lembi sono normali
- d. L'anello non è mai dilatato

IT DI "TIPO III"

In quale caso l'IT si definisce di "Tipo III"?

- a. Prolasso di uno o più lembi valvolari
- b. Restrizione del movimento dei lembi valvolari
- c. E' sempre associata una stenosi della valvola aortica
- d. E' sempre determinata da endocardite

RISPOSTE
CORRETTE

DOMANDA	RISPOSTA
1	A
2	D
3	B
4	C
5	B
6	A
7	D
8	A
9	A
10	B