

PARTE III

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

ACQUISITE

ALTRE PATOLOGIE VALVOLARI

Luigi Chiariello, Paolo Nardi, Giovanni A. Chiariello, Guglielmo Saitto



PATOLOGIA MULTIVALVOLARE CARDIACA

Quale eziologia più frequentemente determina una patologia multivalvolare cardiaca?

- a. Reumatica
- b. Infettiva
- c. Aterosclerotica
- d. Degenerativa calcifica

VALVULOPATIA MULTIPLA

Qual è la valvulopatia multipla che si riscontra più frequentemente?

- a. Mitro-aortica-tricuspidale
- b. Mitro-aortica
- c. Aortica-tricuspidale
- d. Tricuspidale-polmonare

VALVULOPATIE PRIMITIVE

Quale delle seguenti valvulopatie primitive determina più frequentemente il coinvolgimento secondario della tricuspide?

- a. Stenosi mitralica
- b. Stenosi aortica
- c. Stenosi polmonare
- d. Insufficienza mitralica

VALVULOPATIA MULTIPLA

Qual è attualmente il rischio chirurgico del trattamento di una valvulopatia multipla?

- a. 5-10%
- b. 20-30%
- c. 1-3%
- d. 40-50%

INTERVENTO DI DE VEGA

Che cosa si intende per intervento di De Vega?

- a. Anuloplastica riduttiva della tricuspide
- b. Sostituzione della tricuspide con protesi biologica
- c. Anuloplastica della tricuspide con impiego di anello protesico
- d. Nessuna delle precedenti risposte

ENDOCARDITE

Quali germi più frequentemente causano endocardite?

- a. Gram-negativi
- b. Virus
- c. Gram-positivi
- d. Funghi

ENDOCARDITE ACUTA

Quale dei seguenti germi causa con maggiore frequenza una endocardite acuta?

- a. Stafilococco aureo
- b. Stafilococco epidermidis
- c. Streptococco betaemolitico
- d. Enterococco faecalis

DIAGNOSI DI ENDOCARDITE

Come si fa diagnosi di endocardite?

- a. Con l'esecuzione della TC-PET e della TC-Total Body
- b. Con i criteri di Duke + criteri patologici
- c. Con 1 criterio minore di Duke + Rx-torace
- d. Con il cateterismo cardiaco

ENDOCARDITI SU PROTESI

Per quanto tempo la somministrazione degli antibiotici viene raccomandata per le endocarditi su protesi?

- a. Almeno 4-6 settimane
- b. Almeno 2-4 settimane
- c. 7-10 giorni
- d. Per un tempo illimitato

RIPARAZIONE VALVOLARE

Per quale tipo di endocardite è possibile effettuare la riparazione valvolare in alternativa alla sostituzione?

- a. Endocardite su protesi mitralica
- b. Endocardite su valvola mitrale nativa
- c. Endocardite su valvola aortica nativa
- d. In presenza di ascesso anulare aortico

ENDOCARDITE DELLA VALVOLA TRICUSPIDE

In quali pazienti è più frequente l'endocardite della valvola tricuspide?

- a. Molto anziani
- b. Affetti da dotto di Botallo pervio
- c. Con pregresso reumatismo articolare
- d. Tossicodipendenti

RISPOSTE
CORRETTE

DOMANDA	RISPOSTA
1	A
2	B
3	A
4	A
5	A
6	C
7	A
8	B
9	A
10	B
11	D